

## <定期予防接種の種類と接種時期>

※定められた対象年齢、接種間隔等から外れた場合は、自己負担（有料）になります。

種類		対象年齢	標準の 接種年齢	回数	接種間隔（標準的な接種間隔）	備考	
ロタ	1価	生後6週0日～24週0日	2か月～14週6日に接種を開始	2回	27日以上の間隔で2回	1価（ロタリックス）と5価（ロタテック）の予防効果に、明らかな差は認められていません。	
	5価	生後6週0日～32週0日		3回	27日以上の間隔で3回		
5種混合 (DPT-IPV-Hib) ジフテリア、百日せき 破傷風、ポリオ、ヒブ	1期初回	2か月～7歳半未満	生後2月～6月	4回	20日以上（20日～56日）の間隔で3回接種	R6.4.1から定期接種となりました。「4種混合ワクチン」と「ヒブワクチン」を一度も接種していない方が対象となります。	
	1期追加				1期初回3回目の接種後6か月～1年半未満の間隔で1回		
4種混合 (DPT-IPV) ジフテリア、百日せき 破傷風、ポリオ	1期初回	2か月～7歳半未満	生後2月～11月	4回	20日以上（20日～56日）の間隔で3回接種	「4種混合ワクチン」または「ヒブワクチン」を一度でも接種した方は、引き続き「4種混合ワクチン」と「ヒブワクチン」を接種します。	
	1期追加				1期初回3回目の接種後1年～1年半未満の間隔で1回		
H i b（ヒブ）		2か月～5歳未満	生後2月～6月に接種開始	4回	初回：1歳に至るまでに、27日以上（27日～56日）の間隔で3回 追加：初回3回目接種後7か月以上（7か月～13か月未満）の間隔で1回	標準の接種開始年齢を過ぎた等の場合、接種回数が異なります。早めに、かかりつけ医師とご相談ください。	
小児肺炎球菌		2か月～5歳未満	生後2月～6月に接種開始	4回	初回：1歳に至るまでに27日以上の間隔で3回 追加：1歳～1歳3か月に至るまでに初回3回目の接種後60日以上の間隔で1回		
B型肝炎		1歳未満	生後2月～8月	3回	27日以上の間隔で2回接種後、1回目の注射から139日以上の間隔で1回	母子感染予防（保険適用）としてすでにB型肝炎ワクチンを接種した方は対象外です。	
B C G		1歳未満	生後5月～7月	1回			
麻しん・ 風しん (MR)	1期	1歳～2歳未満		1回		麻しん又は風しんどちらにかかった方も、麻しん風しん混合ワクチンを接種できます。	
	2期	5歳～7歳未満で小学校就学前の1年間（年長）		1回			
水痘		1歳～3歳未満	1回目は生後12月～14月	2回	3か月以上（標準的には1回目の接種から6月～12月まで）の間隔で2回	水ぼうそうにかかった方は対象外です。	
日本脳炎	1期初回	6か月～7歳半未満	3歳	3回	6日以上（標準的には6～28日まで）の間隔で2回	<特例対象者について> H16.4.2～H19.4.1生まれ（20歳未満）の方で日本脳炎の予防接種が終了していない方が対象。 ★接種時期に、対象者へ個別通知します。	
	1期追加	6か月～7歳半未満	4歳		1期初回2回目の接種後6か月以上（標準的にはおおむね1年）を経過した時期に1回		
	2期	9歳～13歳未満	9歳	1回			
2種混合（DT） ジフテリア、破傷風		小学6年生（11歳～13歳未満）	11歳	1回		★接種時期に、対象者へ個別通知します。	
H P V	2価	小学校6年生～高校1年生相当年齢の女子	中学校1年生	3回	1回目から1月の間隔をおいて2回目を接種後、1回目から6月の間隔をおいて3回目を接種	★接種時期に、対象者へ個別通知します。	
					1回目から2月の間隔をおいて2回目を接種後、1回目から6月の間隔をおいて3回目を接種		
	9価			2回	15歳未満		1回目から6か月後に2回目を接種。※1回目から少なくとも5か月以上あける
				3回	15歳以上		1回目から2月の間隔をおいて2回目を接種後、1回目の注射から6月の間隔をおいて3回目を接種